

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-8-73 507453  
BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG-CEDEX

Supplément n° 3 au Bulletin n° 155 du mois d'Août 1973

13 Août 1973

### ARBRES FRUITIERS

#### - POMMIER - POIRIER -

#### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le deuxième vol s'est amorcé le 30 Juillet. Les captures des papillons dans nos pièges sexuels étaient relativement importantes dès les premiers jours de ce mois. Actuellement, le vol se poursuit, mais son intensité diminue.

Nous sommes en droit de nous attendre à des dégâts notables car le temps chaud a été et reste favorable aux pontes. Les toutes premières éclosions viennent de se produire. En conséquence, nous recommandons d'intervenir en toutes régions, avant le 18 Août.

Sur les variétés hâtives, tenir compte de la législation en vigueur, concernant le délai d'emploi des produits.

#### ARAIGNEES ROUGES

Des pullulations d'Araignées rouges sont observées dans certains vergers de pommiers, surtout dans les cas où le traitement de printemps a été négligé.

Dans ces vergers où le feuillage prend une coloration bronzée, intervenir de toute urgence avec un produit acaricide spécifique. Ce traitement pourra être combiné avec le traitement Carpocapse, mais il est impératif de bien mouiller le feuillage pour que le produit trouve toute son efficacité.

Dans les autres vergers, il importe d'être vigilant, car le temps actuel est à même de favoriser une augmentation très rapide des populations.

Avant d'effectuer le traitement contre le Carpocapse, il serait sage de faire quelques sondages dans les vergers, afin de se rendre compte de la nécessité d'un traitement mixte. A défaut de loupe, on pourra presser la face inférieure des feuilles sur du papier blanc. Les impacts laissés par les Araignées écrasées sur le papier seront, ainsi, parfaitement visibles.

#### - PRUNIER -

#### ARAIGNEES ROUGES

Les Araignées rouges se développent également sur pruniers avec une certaine intensité. On aura soin de surveiller attentivement les cultures, de façon à intervenir si les populations deviennent dangereuses.

En ce qui concerne les mirabelliers, le traitement ne devrait être réalisé qu'en cas d'extrême nécessité, car la maturité des fruits est avancée et les premières récoltes débutent. Si un traitement devait maintenant s'imposer, respecter rigoureusement le délai d'emploi des produits.

Ainsi, nous conseillons d'attendre la fin de la récolte pour intervenir.

.../...

271

VIGNE

POURRITURE GRISE (Botrytis)

Les conditions climatiques de la deuxième quinzaine de Juillet ont eu pour conséquence fâcheuse, de voir le Botrytis s'installer sur grappes avant la véraison. Ces attaques sont à considérer comme particulièrement dangereuses en fonction du stade végétatif actuel de la vigne. Nos viticulteurs doivent faire preuve de la plus grande prudence. Le flétrissement du pédoncule se manifeste également, surtout dans les vignobles de plaine, se traduisent par une chute prématurée des baies.

Cette année, les grappes sont particulièrement serrées et en ce début de véraison, nous allons vraisemblablement observer des éclatements de baies dans un pourcentage anormalement élevé, allant en s'amplifiant jusqu'aux vendanges. Devant cette situation, toutes les techniques de lutte doivent être mises en oeuvre pour freiner au maximum le développement du champignon. Ainsi, nous conseillons :

1) De poursuivre le rognage et d'enlever les feuilles pouvant cacher les grappes afin d'assurer à ces dernières, le maximum d'ensoleillement, ce qui leur permettra de ressuyer plus rapidement après une pluie.

2) De détruire les mauvaises herbes, qui augmentent la durée et le taux d'humidité au niveau de la vigne.

3) De renouveler le traitement fongicide à la véraison, c'est-à-dire au courant de cette semaine. Apporter beaucoup de soin à ce traitement, en visant bien les grappes.

La technique d'un passage tous les deux rangs n'est pas à retenir. Travailler rang par rang.

Enfin, nous signalons que la Pourriture grise s'observe, avec plus ou moins d'intensité, sur tous les cépages.

ARAIGNEES ROUGES

En dehors de quelques cas isolés (SIGOLSHEIM, PFAFFENHEIM, WESTHALTEN), un traitement acaricide ne s'impose pas dans l'immédiat.

! Les traitements d'assurance sont à proscrire, car ils ne visent qu'à détruire !  
! la faune auxiliaire. !

Cependant, poursuivre les observations sur l'évolution de ces ravageurs car, en cas de persistance du temps chaud que nous connaissons, un traitement pourrait s'imposer dans quelques secteurs à la fin du mois.

CULTURES MARAICHÈRES

- POIREAU -

TEIGNE DU POIREAU

Renouveler le traitement insecticide dans les meilleurs délais mais en tenant compte, lors du choix du produit, du délai d'emploi avant la récolte.

Ajouter, le cas échéant, un mouillant à la bouillie.

- TOMATE -

MILDIOU

Un nouveau traitement fongicide est à envisager. Ce traitement pourra être retardé jusqu'à l'annonce d'une perturbation. Intervenir sans tarder dans les régions intéressées par les orages du 11 Août.

Les Ingénieurs chargés des  
Avertissements Agricoles :  
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la  
Circonscription Phytosanitaire  
"ALSACE et LORRAINE"  
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 2 au Bulletin n° 155 publié le 8 Août 1973.